

倍納降® 20.0

Benasion® 20.0

【成 份】每錠(350mg)含有: Benazepril hydrochloride..... 20mg(等同於Benazepril 18.42mg)

【適應症】

犬:治療鬱血心衰竭。

【用法用量】

應每日口服一次，餐前或隨餐服用。治療期長度沒有限制。
•犬:每日每公斤體重至少0.25毫克(範圍0.25-0.5毫克) Benazepril hydrochloride，
請遵循下表用量：

犬隻體重 (公斤)	錠劑數量	
	正常劑量	雙倍劑量
20 - 40	1/2	1
>40 - 80	1	2

當犬隻患有鬱血性心衰竭時，經主治醫師指示，可服用雙倍劑量，但每日仍然服用一次。

劑量範圍:每日每公斤體重至少0.5-1毫克 Benazepril hydrochloride。

【使用禁忌】

- 不可使用於對 Benazepril hydrochloride 或其他賦形劑成分過敏的犬隻。
- 不可使用於低血壓、低血容量或急性腎衰竭的犬隻。
- 不可使用於主動脈或肺動脈狹窄而造成心輸出衰竭的犬隻。
- 不可使用於懷孕或泌乳犬隻。因尚未建立 Benazepril hydrochloride 於繁殖、懷孕或泌乳方面的安全資料。

【副作用】

患有鬱血性心臟衰竭的犬隻治療時可能會出現嘔吐或倦怠的現象。
若觀察到上述未提及的副作用症狀，請告知您的主治獸醫師。

【使用於動物之注意事項】

患有慢性腎臟病的動物，治療前主治獸醫師會檢查其脫水狀態。治療期間，可能建議定期血檢，以了解血漿中的肌酸酐濃度及紅血球數目。

【藥物性質】

- Benazepril hydrochloride 為一前驅藥物，於體內水解代謝成活性代謝物 Benazeprilat，Benazeprilat 是高效和高選擇性血管收縮素轉化酶抑制劑，並抑制血管收縮素 I (angiotensin I) 轉化成具有活性的血管收縮素 II (angiotensin II)，進而降低醛固酮的合成。因而抑制所有血管收縮素 II 和醛固酮的傳導，影響動脈及靜脈血管收縮，以及腎臟對鈉離子和水分的保留，使其運作回復平衡 (包含病理性心肌肥厚及退化性腎臟變化)。
- 針對犬隻鬱血性心臟衰竭，Benazepril 可減少心臟血壓及容積量。
- 相較於其他的血管收縮素轉化酶抑制劑，狗 54% 透過膽管和 46% 透過尿液將 benazeprilat 排泄出體外，因此本品治療腎功能不全時，不需要調整劑量。

【藥物之交互作用】

- 請告知主治獸醫師您的犬隻目前正在使用及最近使用過的藥物。
- 人類同時服用血管收縮素轉化酶抑制劑與非類固醇類消炎藥，可能會降低降高血壓藥物的效能，或使腎臟功能受損。本品和其他降高血壓藥物 (如: 鈣離子通道抑制劑、β 抑制劑或利尿劑)、麻醉藥或鎮靜劑可能會引起低血壓症狀。因此和非類固醇類消炎藥或其他具有降血壓的藥物同時服用時，需多加留意。
- 主治獸醫師可能會建議進行詳細的腎功能檢查及低血壓症狀 (昏睡、虛弱...等)，如果必要，則會進行治療。
- 同時服用本品和保鉀性利尿劑，如: spironolactone、triamterene 或 amiloride 需追蹤血鉀濃度，避免高血鉀症。

【過量使用(症狀、危機處理、解毒劑)】

•過量使用會導致犬發生可逆性的暫時性低血壓。

【操作人員之注意事項】

- 使用後請洗手。如不慎誤食應立即尋求醫師協助，並將本品仿單或外盒交給醫師參考。
- 孕婦若不慎誤食，請給予特別照護，因血管收縮素轉化酶抑制劑對胎兒具有影響。

【儲存條件】

請存放於孩童無法觸及處。本產品儲存於室溫陰涼處。
任何未使用的獸醫產品或與獸藥品有關的廢棄物均應依當地法規進行處置。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用

【包裝規格】50錠/瓶、100錠/瓶

產品批號、製造日期、有效日期請見外盒及瓶身標示。

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 | (03) 621 6688
產品編號：441011010 217518641

