

恩樂素

動物藥製字 第09629號

動物用 錠劑

Enlocin

【成份】每錠(310mg)含有Enrofloxacin 150 mg

【適應症】

犬:用於治療犬對enrofloxacin具敏感性的革蘭氏陰性菌或革蘭氏陽性菌所引起的細菌感染:大腸桿菌(*E. coli.*)、沙氏桿菌(*Salmonella spp.*)、巴斯德桿菌(*Pasteurella spp.*)、嗜血桿菌(*Haemophilus spp.*)以及葡萄球菌(*Staphylococci*)。

【對象動物】犬

【用法用量】

本藥品為口服投藥。

每公斤體重日劑量為5毫克enrofloxacin,即30公斤體重,每日服用一錠恩樂素。投藥時可直接給予口服,或是包在肉或香腸中餵食對象動物。一般建議連續投藥5到10天。若投藥3天後臨床症狀沒有改善的話,應重新進行藥物敏感性試驗,必要時應改變治療的方式。

【過量投藥】

若不慎投藥過量,對象動物起初可能會出現食慾減退與嘔吐情形。這時可投與含鎂或鋁的制酸劑來降低enrofloxacin的吸收。

【禁忌症】

犬:目前已知fluoroquinolone類對於成長期動物的關節軟骨有不可逆的傷害,所以12月齡以下或是還在成長中的狗禁止使用本藥品來治療。

請勿使用於已知有軟骨生長不全的動物。

請勿使用於懷孕或哺乳期的動物。

請勿使用於有中樞神經性癲癇的動物。

Enrofloxacin部分是經由腎臟排出,如同所有的fluoroquinolone類藥物,腎功能損傷的動物對於本產品的排出會有影響。

請勿使用於產食動物。

請勿使用於已知對fluoroquinolone類藥物過敏的動物。

【副作用】

若對象動物在服用本藥品後出現任何副作用,請立即尋求獸醫師的診療。

【停藥期】

不適用於本藥品。

【藥理學特性】

藥物動力學

Enrofloxacin屬fluoroquinolone類抗生素,其抗菌作用是藉由結合細菌的DNA旋轉酶上的A-subunit來抑制該酵素的作用,DNA旋轉酶屬於一種拓模異構酶(topoisomerase),該酵素與細菌DNA的複製、轉錄與重組有關。Fluoroquinolone類抗生素對於生長靜止期的細菌亦有作用,可改變細菌細胞壁的通透性來達到抗菌的效果。這些機制可解釋為何投與enrofloxacin後可快速地降低細菌的活性。Enrofloxacin的抑菌與殺菌的濃度非常接近,兩者可說幾乎是一致或僅有一或兩倍稀釋倍數間的差距。低濃度的enrofloxacin對於大多數的革蘭氏陰性菌,許多革蘭氏陽性菌與微漿菌具有效能。

【與其他藥品的交互作用】

如果有使用theophylline藥物可能會延緩theophylline的排出。

合併使用藥品含chloramphenicol、macrolide或tetracycline類抗生素可能會產生拮抗作用。

投與本藥品的同時請勿合併使用含鎂或鋁的產品,可能會影響enrofloxacin的吸收。

不同的fluoroquinolone類抗生素之間會有交叉抗藥性。

【與其他藥品的不相容性】

無

【使用時應特別注意事項】

對象動物:

在使用本藥品治療對象動物之前,應先做藥物敏感性,並確認該致病細菌對其他抗生素具抗藥性。對於一般的感染症非必要時不需要使用本藥品,以避免抗藥性的產生。

使用者:

如果已知對fluoroquinolone類藥物過敏的人請避免接觸本藥品。在使用本藥品時請勿飲食或吸菸,使用過後請洗手。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用

【儲存條件】

本產品請緊閉儲存於室溫陰涼乾燥處,避免陽光直射。

【包裝規格】50錠/瓶裝、100錠/瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期:請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 |(03) 621 6688

產品編號:441013010(EFT)

217519141