

長定除250毫克錠

FLT250
動物藥製字 第09677號

動物用 錠劑

Fluremove 250 mg Tablet

【成 份】每錠(450mg)含有Fluralaner 250 mg

【適應症】

犬：治療壁蝨和跳蚤感染。
本藥品是一種系統性的殺蟲和殺蟎藥，可提供：
-立即且持久的殺跳蚤(*Ctenocephalides felis*)效果長達12週
-立即且持久的殺壁蝨(*Rhipicephalus sanguineus*, *Hoemaphysalis longicornis*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, *D. variabilis*)，效果長達12週
跳蚤和壁蝨須接觸到宿主並開始攝食以曝露在活性作用成分。在跳蚤(*C. felis*)和壁蝨(*I. ricinus*)吸附後8和12小時內會達到有效殺滅作用。
本品可以做為治療跳蚤過敏性皮膚炎(FAD)的控制計畫用藥
治療由毛囊蟲(*Demodex Canis*)引起的毛囊蟲感染症。
治療蟎蟲(*Sarcoptes Scabiei var. canis*)感染。
降低由網紋革蜱(*Dermacentor reticulatus*)媒介的焦蟲(*Babesia canis*)感染風險。

【劑量、投藥方法與途徑】

口服使用。(施用劑量相當於25-56毫克/每公斤體重Fluralaner劑量)

適用體重(八週齡起)	本品使用量
> 4.5-10公斤小型犬	1 錠

請勿撥開或分裝咀嚼錠。
在用餐前後或用餐當中餵食咀嚼錠。
本品具有良好的適口性，絕大多數的狗狗都樂意接受。若犬隻不願意主動食用，可以和食物混合餵食，或是直接經口給予。投藥過程中應確認藥錠有確實地被犬隻完全食入，以確保有效劑量的攝取。
治療計畫：欲達到最佳的跳蚤，壁蝨感染控制效果，本品應間隔每12週投藥一次。
治療由毛囊蟲(*Demodex Canis*)感染，應給予單劑量的產品。由於毛囊蟲症是一種多種因素的疾病，因此也建議同時適當治療任何潛在疾病。
治療蟎蟲(*Sarcoptes Scabiei var. canis*)感染，應給予單劑量的產品。再次給藥的需要和頻率應遵循處方獸醫的建議。

【使用禁忌】

不可用於對活性物質或任何賦形劑過敏的犬隻。

【不良反應】

臨床試驗中常可觀察到犬隻出現輕度或短暫的胃腸道反應(1.6%)。例如下痢、嘔吐、食慾不振和流涎。
抽搐及嗜睡反應曾被報告過。但發生比例非常罕見。於自發性報告中，罕見發生昏睡、肌肉震顫、共濟失調及抽搐。多數被報告的不良反應皆屬自限性且可於短期內停止。
不良反應的頻率是依照以下常用標準所定義：
-非常常見(10隻動物中，超過1隻在治療期間發生不良反應)。
-常見(100隻動物中，超過1隻，但小於10隻在治療期間發生不良反應)。
-少見(1,000動物中，超過1隻，但小於10隻在治療期間發生不良反應)。
-罕見(10,000動物中，超過1隻，但小於10隻在治療期間發生不良反應)。
-非常罕見(10,000 隻動物中小於1隻在治療期間發生不良反應，包含獨立試驗報告)。
如果您觀察到本說明中沒有提及的任何其他用藥後不良影響，請通知您的獸醫師。

【警告】

對象動物：寄生蟲需在宿主身上攝入主要活性物質後才會開始發揮效用，因此不能完全排除寄生蟲媒介性疾病傳播的風險。
使用於動物的特別注意事項：有癲癇病史的犬隻須謹慎使用。由於沒有相關實驗數據，所以本品不應使用小於八週齡的幼犬，和/或體重低於兩公斤的犬隻。由於目前沒有短於八週重複投藥的安全性試驗相關數據，所以本品的投藥間隔不應小於八週。
投藥人員的特別注意事項：為防止被兒童取得誤食。本品應保存於原包裝內，直到準備好投藥前才開封。在人類曾有過敏反應被報導。使用本品時請勿飲食或抽菸。投藥後請立即用肥皂和清水洗手。
懷孕、哺乳和生育能力：本品可使用於繁殖、懷孕和泌乳期的犬隻。
藥物交互作用：Fluralaner 和血漿蛋白有高度結合性，所以可能與其他具有高度結合性的藥物競爭，例如非類固醇消炎藥(NSAIDs)及香豆素衍生物warfarin。在含有carprofen或warfarin 的犬血漿中，加入預期fluralaner可在體內達到的最高血漿濃度進行試驗，結果顯示並不會降低Fluralaner、carprofen或warfarin 的血漿蛋白結合率。
在臨床試驗中，並沒有觀察到咀嚼錠和犬隻常用的獸醫藥品產生交互作用。

過量(症狀、緊急處理程序、解毒劑):
口服投予最高至5倍最大建議劑量(分別於56mg、168mg及280mg/公斤體重之Fluralaner)於體重介於2.0-3.6公斤,年齡八到九週齡的幼犬上,且於短於建議的重複投藥時間內投藥三次後(分別間隔八週),無發現任何不良影響。
口服投予最高至3倍最大建議劑量(最大至168mg/公斤體重)於米格魯犬隻,無發現對於繁殖能力及對後代存活率有影響。
本品在multidrug-resistance-protein 1(MDR1 -/-)基因缺陷的牧羊犬,單次投予三倍建議劑量(168mg/公斤體重),耐受性良好。無發現任何與治療相關的臨床症狀。

【注意事項】

- 1.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。
- 2.請勿將藥品棄置於廢水或一般垃圾中。基於環境保護,請詢問獸醫師如何處理不再使用的藥錠,並依規定處理。空盒或殘餘藥品,請依當地廢棄物法規處理。

【保存的特別注意事項】

- 1.勿放置於孩童可及之處。
- 2.本產品請至於室溫下保存。
- 3.逾失效日期,請勿使用。
- 4.有效期限: 兩年

【包裝規格】 1 錠/瓶

產品批號、製造日期及有效日期:請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證