

健心保 PI-M68

IVTd68

動物藥入字 第07183號

動物用 錠劑

IvermecPI-68

成分及份量:本劑1個(4.6g)中

Ivermectin.....68 µg

Pyrantel pamoate.....163 mg

效能:預防犬心絲蟲寄生, 祛除犬蛔蟲及犬鉤蟲。

用法用量:以體重每1公斤給予Ivermectin 6 µg, Pyrantel pamoate 14.4 mg為基準量, 讓體重5.7 Kg~11.3 Kg犬隻服用1個本劑。從感染犬心絲蟲後1個月開始到感染結束後1個月之期間, 每個月投予本劑1次。

注意事項:

【一般注意事項】

1. 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。
2. 本劑只可使用於效能及效果所規定之目的。
3. 本劑嚴格遵守規定之用法及用量。

【使用者注意事項】

誤服藥劑時, 立即前往醫院接受醫師診察。

【犬隻注意事項】

1. 禁忌事項

- (1) 本劑投予前先做健康狀態檢查, 請勿投予給有異常狀況之犬隻。
- (2) 本劑投予前利用集蟲法、抗原檢查法檢查有無犬心絲蟲感染, 投予到感染犬心絲蟲的犬隻時, 實施祛除成蟲及幼絲蟲的適當處理, 慎重投藥。
- (3) 請勿投予本劑給離乳前幼犬。
- (4) 有報告指出Ivermectin 可能對牧羊犬及其系統犬種有神經毒性, 當投予到牧羊犬及該系統犬種時請慎重投予。

2. 副作用

- (1) 出現副作用時, 請儘速由獸醫師診察。
- (2) 投予本劑後, 可能出現食慾不振、嘔吐、下痢(軟便)、無精打采、走路異常、痙攣、流涎之情形。
- (3) 投予本劑給感染犬心絲蟲之犬隻, 可能出現急性犬心絲蟲症(大靜脈症候群)、食慾不振、嘔吐、下痢(軟便)、無精打采、走路異常、痙攣、流涎及皮膚過敏(發紅、搔癢)之情形。

3. 交互作用

請勿將本劑併用其它犬心絲蟲預防用藥或犬蛔蟲、犬鉤蟲驅蟲藥。

4. 適用注意事項

- (1) 請勿過量投予, 於投予本劑前測量體重。
- (2) 本劑對於犬心絲成蟲無效, 請勿用於祛除成蟲。

【管理注意事項】

- (1) 本劑的外觀或內容物出現異常時, 請勿使用。
- (2) 本劑為設定有效期限之動物用藥, 請勿使用超過使用期限之產品。

【保管注意事項】

- (1) 請儲放於兒童不易拿取之處。
- (2) 儲放本劑於請避免日光直射及高溫之處。

本劑原料含天然物質, 因此產品的色調、大小等外觀會出現差異, 產品表面有黑色、白色等不同顏色之情形, 但當包裝等未出現缺陷時, 效果、安全性及安定性並無問題。

有效期限: 36個月(製造批號及使用期限記於右下角)。

包裝: 本劑依犬隻不同體重分為四種劑量, 劑量包裝有6錠及144錠兩種包裝。

製造廠: FUJITA製藥株式會社 東京工場

東京都八王子市樺町1211番地1號

代理商: 永鴻國際生技股份有限公司

30442 新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

03 - 621 6688

產品編號: P476013020

物料編號: 217519541

