

免樂疼

Achebye

【性狀】

本品為黃色的澄明液體。

【藥理作用】

藥效學

本品為解熱鎮痛非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs)，主要通過抑制環氧化酶 (COX) 的活性，減少前列腺素 (PGs) 的合成而發揮解熱鎮痛抗炎的作用。Meloxicam 還可減少粒細胞的炎症組織浸潤。本品能選擇性地抑制環氧化酶 (COX-2)，而對環氧化酶 1 (COX-1) 的抑制作用較弱。因此，本品對胃腸道或腎臟的不良反應較弱。

藥動學

本品皮下注射給藥後，犬：約 2.5 小時達最大血藥濃度，最大血藥濃度為 0.73 µg/mL，在治療劑量範圍內，給藥劑量和血藥濃度之間存在線性關係。血漿蛋白結合率大於 97%，分佈體積為 0.3 L/kg，Meloxicam 多分佈於血漿中，Meloxicam 代謝為無藥理活性的醇、酸衍生物和多種極性的代謝物。約 75% 的藥物經糞便排泄，剩餘部分經尿液排泄。貓：約 1.5 小時達最大血藥濃度，最大血藥濃度為 1.1 µg/mL，在治療劑量範圍內，給藥劑量和血藥濃度之間存在線性關係。血漿蛋白結合率大於 97%，分佈體積為 0.09 L/kg，Meloxicam 多分佈於血漿中，Meloxicam 代謝為無藥理活性的醇、酸衍生物和多種極性的代謝物。在貓體內 Meloxicam 生物轉化的主要途徑為氧化，Meloxicam 消除半衰期是 24 小時，約 21% 的藥物經尿液排泄 (2% 為原形 Meloxicam，19% 為其代謝物)，79% 經糞便排泄 (49% 為原形 Meloxicam，30% 為其代謝物)。

【成份】每 1 毫升 (mL) 含有 Meloxicam 5 mg

【適應症】

犬 - 緩解急性慢性肌肉骨骼傷害炎症及疼痛，骨科或其他軟組織術後炎症及疼痛。

貓 - 緩解子宮卵巢切除術及其他軟組織小手術的術後炎症及疼痛。

【用法用量】

犬 - 靜脈或者皮下注射，限一次量，每 1 kg 體重 0.2 mg (即 0.04 mL/kg)

貓 - 皮下注射，限一次量，每 1 kg 體重 0.3 mg (即 0.06 mL/kg)。

【不良反應】

典型的非類固醇抗發炎劑不良作用，例如食欲減退、嘔吐、腹瀉、糞便潛血、嗜睡、偶有腎衰竭；極少數情況下會發生過敏性反應；極罕見的情況下，犬會出現肝臟酶升高、便血、嘔血和消化道潰瘍，這些犬的不良反應通常是暫時性的，極少數引起死亡。

【注意事項】

1. 禁用於懷孕或哺乳動物、6 週齡以下的動物或者體重小於 2 kg 的貓。
2. 禁用於胃腸道疾病、肝臟、心臟或腎功能受損及出血異常的動物。
3. 禁用於對本品過敏的犬貓。
4. 禁與糖皮質激素、其他非類固醇抗發炎劑、利尿藥、抗凝血藥等聯合使用。
5. 本品有潛在的腎臟毒性，避免用於脫水的、血容量減少或血壓低的動物。
6. 對非類固醇抗發炎劑高度敏感的人避免接觸本品。

本處方藥品限由執業獸醫師 (佐) 監督之下使用

【儲存條件】

儲存於陰涼乾燥處，避免陽光直接照射

【包裝規格】10、20、50、100 毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見外盒及瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001 認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段 181 號 12 樓 | 02-2718-6200

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙 290-3 號

產品編號：431010010

217518041