

吐拜® 16

MRT16
動物藥製字 第09593號
動物用 錠劑

Maropin® 16

【成份】每錠(175mg)含有Maropitant Citrate 16 mg (pot.)

【適應症】

犬：預防嘔吐(包括因化學療法而引起及動暈症引起的嘔吐)。

【對象動物】

犬

【用法用量】

本品以口服投藥。

•預防及治療嘔吐(除了動暈症以外)-限用於8週齡以上犬隻
對於治療及或預防的嘔吐(除了動暈症以外)，口服投予2毫克/公斤體重Maropitant劑量(依下表推薦劑量投予)，每日一次，可沿著錠劑刻痕折半服用。對於預防嘔吐，應提早1小時以前投予。本品止吐效果約可持續24小時，故在投予可能造成嘔吐的藥劑(化學療法)前一晚先給予本品，可連續使用14天。

治療嘔吐(除動暈症以外)	
犬隻體重(公斤)	錠劑數量
3.0-4.0*	1/2
4.1-8.0	1

*低於3公斤體重犬隻的正確劑量無法精確地計算

•預防因動暈症引起的嘔吐-限用於16週齡以上犬隻

對於預防因動暈症引起的嘔吐，口服投予8毫克/公斤體重Maropitant之劑量(依下表推薦劑量投予)，每日一次，可沿著錠劑刻痕折半服用。應於開始旅行前1小時(至少)進行投藥。抗嘔吐的作用可持續至少12小時，故可方便將於一大早旅行的犬隻於前一晚先行投藥，可連續投藥2天。對某些個別犬隻及重覆投藥的情況下，投予比推薦劑量少的藥量可能是足夠的。

預防因動暈症引起的嘔吐	
犬隻體重(公斤)	錠劑數量
1.6-2.0	1
3.1-4.0	2

【禁忌症】

無

【不良反應】

犬隻被空腹投予本品可能會引起嘔吐，故在投予本品前先給予犬隻少許乾糧或點心以預防嘔吐，應避免投藥前的長期禁食。
本產品並非鎮定劑，部分具動暈症犬隻在旅行期間可能出現類似暈車的症狀如流涎及嗜睡。這些症狀是暫時性的，當旅行結束時症狀即消失。
如果出現任何嚴重反應或其他未提及的副作用，請告知您的獸醫師。

【特別警告】

- 嘔吐的發生可能與嚴重、極為虛弱的情況有關，其原因應予以調查。本品的投予應依照您獸醫師建議，一併與其他支持性措施如禁食等同時實施。本品安全性尚未被建立於，如：患有病毒性腸炎之幼犬的目標族群。若治療需持續5天以上，應仔細地監控犬隻臨床反應。
- Maropitant在肝臟中代謝，故對有肝臟疾病的犬隻應小心處理。於本品14天的療程下，Maropitant可能因代謝飽和而積聚於動物體內，故應仔細地監控犬隻肝臟功能。
- 本品安全性尚未被建立於：(1)以8毫克/公斤劑量投予未滿16週齡犬隻，預防因動暈症引起的嘔吐；(2)以2毫克/公斤劑量投予未滿8週齡犬隻，預防及治療嘔吐(除了動暈症以外)；(3)懷孕或泌乳母犬使用。故獸醫師在對未滿8週、16週齡犬隻，懷孕或泌乳母犬投予本品前應自行進行效益風險評估。
- 當本品被投予超過20毫克 /公斤的過量藥劑時會出現如第一次投藥的嘔吐、過度流涎和水便等臨床症狀。
- 使用後請洗手。如不慎誤食應立即尋求醫師協助，並將產品仿單或標籤交給醫師參考。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用

【儲存條件】

本產品請緊閉儲存於室溫陰涼乾燥處，避免陽光直射。
請存放於孩童無法觸及處，藥物過期後即不可使用。
任何未使用的獸醫產品或與獸藥品有關的廢棄物均應依當地法規進行處置。

【包裝規格】10錠/瓶裝、20錠/瓶裝、30錠/瓶裝、50錠/瓶裝、100錠/瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期：請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 | (03) 621 6688
產品編號：441006010(MRT16) 217518441