

# 耳永通

## Earton

【成份】 Each mL contains Hydrocortisone aceponate (HCA)..... 1.11 mg  
Miconazole as nitrate..... 15.1 mg  
Gentamicin as sulphate..... 1,505 IU

### 【適應症】

犬 - 治療急性外耳炎和對慶大黴素(gentamicin)敏感之細菌性及對咪康唑(miconazole)敏感之黴菌性急性惡化性重複性外耳炎;尤其是皮膚芽胞菌(*Malassezia pachydermatis*)。

### 【用法用量】

犬 - 使用於耳道。

每ml含1.11 mg Hydrocortisone aceponate、15.1mg Miconazole as nitrate和1,505 IU Gentamicin as sulphate。建議於使用前,先將患部過多之耳毛清除並清潔耳道,再使之乾燥。第1次按壓給予前,請先充分搖晃瓶身。建議劑量為每天1次,每隻患耳給予本劑1ml,連續施予5天。將延伸套管深入耳道,給予每隻患耳1劑量(1ml)。1次性的按壓瓶身(按壓約3-5秒)即可給予1劑量。

正確使用方式:

給予藥劑後,應短暫輕柔按摩耳根部,使藥劑能滲入耳道之較低部位。本劑可供犬隻治療雙側性耳炎。本動物用藥品應於常溫下使用(無需冷藏本劑)。

### 【禁忌】

請勿使用於對主成份或賦形劑、皮質類固醇、唑類(azole)抗黴菌劑、胺基配醣體類(aminoglycosides)藥物過敏之患畜。若發生過敏反應,則療程應停止並給予適當的處理。勿使用於耳膜破裂之患畜。勿與會造成耳毒性之藥物併用。

### 【不良反應】

可見輕至中度之皮膚發紅(2.4%病例)。很少造成丘疹(少於1%病例)。大多數使用本動物用藥品治療,而呈現不良反應之病例,並不需中斷使用;且所有的犬隻於恢復時,也不需其它特別治療。使用耳劑可能會影響聽力,但通常為暫時性地;且一般發生於老年犬。如遇任何不適或其它仿單內未提及之藥物反應,請告知獸醫師。

### 【警告事項】

細菌性和黴菌性耳炎常為繼發性,應施予適當的臨床診察以確定其病因。使用本劑應基於病因確診和敏感性試驗之結果,以遵守抗生素使用之原則。對懷孕和泌乳母犬之藥物安全性尚未建立。在建議劑量的使用下,患犬所吸收之HCA、咪康唑和慶大黴素非常微量,不太可能造成致畸胎性(teratogenic),或對母畜和胎畜產生毒性反應。請謹遵獸醫師依醫療風險效益評估所做之指示用藥。與耳道清潔劑之相容性尚未建立。

飼主使用此藥品之注意事項:若不慎碰觸皮膚,建議以大量清水沖洗。請避免碰觸眼睛。若不慎接觸眼睛,以大量清水沖洗。若眼睛受傷,請速就醫。若不慎誤食,請攜帶仿單或標籤,立即就醫。

### 【注意事項】

1. 儲藏方式:勿置於孩童可目視和接觸之處。
2. 此動物用藥品不需特別的儲藏方式。若超過標示之有效日期,請勿使用。
3. 丟棄剩餘產品或廢棄物之注意事項:請詢問獸醫師如何丟棄不再使用之藥劑。此注意事項有助於保護環境。
4. 此動物用藥品合併3種有效物質:抗生素、抗黴菌劑和類固醇。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。

### 【包裝規格】 10、20、50、100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見外盒與瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

國

用

外

用

網

剛

剛