

匹默安 5.0

PMT4
動物藥製字 第09554號

動物用錠劑

Pimotonic 5.0

【成份】每錠(230mg)含有 Pimobendan 5.0 mg

【適應症】

犬：治療因擴張型心肌病變或瓣膜不全(二尖瓣及/或三尖瓣逆流)導致之鬱血性心衰竭。
治療犬臨床前期二尖瓣膜黏液樣退行性疾病MYXOMATOUS MITRAL VALVE DISEASE, MMVD(無臨床症狀但已出現二尖瓣收縮期雜音及心臟擴大),延緩心衰竭臨床症狀的發生。

【使用禁忌】

本品不可用於肥厚性心肌症或臨床顯示因功能或構造導致無法強化心臟輸出之患犬(如主動脈硬化)。
因本品主要經由肝臟代謝,因此不得使用於嚴重肝功能障礙之患者。

【用法用量】

犬：本藥劑應經口投予,使用劑量應在每天每公斤體重0.2 mg 到 0.6 mg Pimobendan範圍內,並將劑量分為兩次投予。每日理想劑量應為每公斤體重0.5 mg,並分兩次投予(每次每公斤體重0.25 mg),並應於早晚進食前1小時餵藥。依照犬隻體重的差異,嚼錠可依刻痕處掰半,以確保劑量精準。

本產品使用建議、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項,請詳閱仿單內容使用。

【用藥建議】

請勿超過建議用量。

【使用於動物之注意事項】

糖尿病患犬應於治療期間定期檢測血糖。

使用於臨床前期擴張型心肌病變(左心室收縮末期及舒張末期直徑增加,但尚未出現症狀),應先進行全面性的心臟檢查(包含心臟超音波檢查,可能的話應進行Holter動態心電圖監測)。

以Pimobendan治療期間,建議監控心臟功能及結構狀態。(另請參閱本仿單「不良反應」)

【操作人員之注意事項】

操作本藥劑後請即洗手。

如不慎食入本藥劑,請立即攜帶本藥劑標籤仿單就醫。

人醫就診建議:誤食本藥劑,尤其發生於孩童時,可發生心搏過速,姿勢性低血壓,面部潮紅及頭痛。

【不良反應】

罕見於患犬引起輕微心跳加速(positively chronotropic effect)及嘔吐,但此反應為劑量相關,降低劑量即可改善。

罕見於患犬發生短暫下痢,食慾或精神不振的現象。

雖然與Pimobendan關係並不明確,但在極罕見患者可能會在治療過程中觀察到,初級凝血功能受到影響(黏膜紫斑,皮下出血),這些症狀在停藥後消失。

罕見於患者長期使用Pimobendan治療二尖瓣性心臟病(mitral valve disease)時,出現二尖瓣迴流(mitral valve regurgitation)增加。

對於不良反應發生的頻率,用語及定義如下:

-極常見:10隻動物中有1隻在一個療程中出現不良反應

-常見:100隻動物中有1隻以上,但10隻以下

-不常見:1,000隻動物中有1隻以上,但10隻以下

-罕見:10,000隻動物中有1隻以上,但10隻以下

-極罕見:10,000隻動物未達1隻,包含個案報告

如發現任何嚴重不良反應或其他未標註於本仿單之反應,請立即與獸醫師聯絡。

【特別警示】

本品未經試驗於併有心房顫動或併有持續性心室心搏過速之無症狀擴張型心肌病變杜賓犬。

【藥物過量】

藥物過量時可發生心搏過速及嘔吐等症狀,如出現症狀應降低劑量並對症治療。

健康小獵犬(beagle)以3至5倍建議劑量長期(6個月)投藥後,部分犬出現二尖瓣及左心室增厚現象,此為藥效動力學導致之變化。

【孕期哺乳使用建議】

實驗室大鼠及兔實驗並未發現致畸胎性或胎兒毒性(teratogenic or foetotoxic effects)等影響,但是在高劑量時出現母體中毒及胚胎毒性(embryotoxic)反應,並發現Pimobendan會分泌進入乳汁。

本藥劑並未進行懷孕及哺乳母犬的安全性試驗評估,所以僅依獸醫師治療效益及風險評估決定。

【藥物交互作用】

藥理研究中，Pimobendan 與強心苷 (cardiac glycoside strophanthin) 之間並無交互作用。

但Pimobendan誘發之心收縮力增加可因以下藥物而衰減，鈣拮抗劑verapamil、diltiazem及β交感神經拮抗劑propranolol。

【藥物相關資訊】

本產品配合furosemide 使用於有症狀的瓣膜閉鎖不全患犬，可有效增加其生活品質及延長生命。

本產品配合furosemide、enalapril及digoxin使用於有症狀的擴張型心肌病變患犬（試驗患犬數量有限），可有效增加其生活品質及延長生命。

在一項隨機安慰劑對照試驗中，試驗犬中包含臨床前期擴張型心肌病變的杜賓大種（經心臟超音波診斷，左心室收縮末期及舒張末期直徑增加，但尚未出現症狀），使用Pimobendan可延後患犬發生鬱血性心衰竭或猝死的時間，並延長生命。

除此，以Pimobendan治療臨床前期擴張型心肌病變可有效縮小患犬心臟尺寸。

【儲存建議】

請儲存於陰涼乾燥處，避免陽光直接照射。

請存放於兒童伸手不及處。

請將本藥劑放置原包裝外盒內。

避免潮濕請將藥劑罐隨時拴緊。

掰半之藥錠請於下次服藥時使用完畢。

【廢棄物處理】

空瓶或殘留藥品，請依當地廢棄物法規處理。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。

【包裝規格】30、50、100錠瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見外盒及瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 I (03) 621 6688

產品編號：441009010

217518243

