

疼利舒® 注射液

ROI
動物藥製字 第09638號

動物用注射劑(注射劑)

Pain-thru® Injection

【成份】每毫升(mL)含有 Robenacoxib 20.0 mg

【適應症】

犬、貓:治療因骨科或軟組織手術伴隨之疼痛及發炎。

【用法用量】

犬、貓:進行手術前約30分鐘,經皮下注射本品。

每10公斤體重注射1mL本品,術後可持續於每天同時間使用相同劑量1次,最多2天。

【禁忌症】

- 1.不可使用於腸胃道潰瘍之犬貓。
- 2.不可與皮質類固醇或其他非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)之藥物併用。
- 3.不可使用於對主成分Robenacoxib或本品其他成分敏感的犬貓。
- 4.不可使用於懷孕或泌乳犬貓。

【不良反應】

- 1.貓:常見腸胃道不良反應(嘔吐、軟便或下痢),但大部份為輕微反應,不需治療即可恢復。下痢或嘔吐帶血並不常見。注射部位疼痛是常見的。
- 2.犬:常見消化道不良反應(如嘔吐,但大部份為輕微反應,且不需治療即可恢復。下痢、軟便及黑便或食慾下降並不常見。注射部位輕微疼痛是常見,但中度或嚴重疼痛則不常見。
- 3.不良反應發生頻率之定義如下:
 - 很常見(在一次治療過程中,10隻動物中有超過1隻出現不良反應)。
 - 常見(100隻動物中有超過1隻但少於10隻)
 - 不常見(1,000隻動物中有超過1隻但少於10隻)
 - 罕見(10,000隻動物中有超過1隻但少於10隻)
 - 非常罕見(10,000隻動物中少過1隻)
- 4.若發生任何嚴重或其他上述未提到的症狀,請告知您的主治獸醫師。

【對象動物注意事項】

- 1.尚未建立年齡小於4個月貓隻及2個月犬隻、或體重低於2.5公斤之犬或貓的安全資訊。
- 2.若犬或貓本身患有心臟、腎臟、肝臟功能受損或處於脫水、出現低循環血液量或低血壓均可能產生額外風險。若無法避免,需要小心地監控和進行輸液療法。
- 3.若犬、貓本身患有消化潰瘍或先前發生過對其他NSAIDs藥物不耐受性,獸醫師應嚴格監控本品之使用。

【使用人員注意事項】

- 1.使用藥品後、應立即清洗雙手及接觸到之皮膚。
- 2.若不慎誤食或誤注入人體,請立即就醫並將仿單或外盒標籤給醫師評估。
- 3.孕婦尤其是懷孕後期,若意外被注射或皮膚接觸本品時間過長,可能增加對胎兒的風險。

【過量使用注意事項】

與其他NSAIDs藥物相同,過量使用均會對敏感及體弱的貓隻造成腸胃道、腎臟或肝臟毒性。無特定解毒劑,若出現症狀,建議使用支持療法,並使用腸胃道保護劑及補充等張生理食鹽水。

【藥物間交互作用】

1. 本品不可與其他NSAIDs類藥物共同使用。若使用本品前已先使用其他抗發炎藥物，可能會造成風險或加重不良反應，因此使用本品前，至少應有24小時這類藥物的無治療期(treatment-free period)。藥物代謝動力學特性也應考慮本品使用前之無治療期。
2. 若同時使用作用於腎血流之藥物，如利尿劑或血管收縮素(ACE)抑制劑，應進行臨床監控。
3. 麻醉可能影響腎灌注(renal perfusion)，當手術前後使用NSAIDs，手術中可考慮能降低腎臟障礙之非口服輸液療法。
4. 應避免同時使用具潛在腎毒性的藥物，因可能會增加腎毒性風險。
5. 若併用其他具高度蛋白質結合之力物質，可能會與Robenacoxib同時競爭結合蛋白質，導致毒性產生。
6. 本品不可與其他動物用藥混合使用。

【儲存注意事項】

1. 避免陽光直接照射及孩童接觸。
2. 本注射瓶應存放於包裝盒內。
3. 請冷藏保存。
4. 請在有效期限內使用，逾失效日期，請勿使用。

【廢棄物處理】

藥物勿棄置於廢水或一般垃圾中。

【包裝規格】 10毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期：請見瓶身標示

本處方藥品限由獸醫師(佐)監督之下使用

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號I(03) 621 6688

產品編號：431031010

217519841

